

Ansprechpartner für Patientenmeldungen

4. Medizinische Klinik:

CA Dr. med. Harald Schmalenberg (0351 480-3741)

OÄ Dr. med. Anne Treschl

Klinik für Allgemein- und

Viszeralchirurgie:

Prof. Dr. med. Sören Torge Mees (0351 480-1520)

OA Dr. med. Alexander Cramer

Klinik für Dermatologie

Dr. med. André Koch

Dr. med. Gesina Hansel

Zentrum für Klinische Studien:

Kerstin Spranger (0351 480 4556)

Juliane Gehre (0351 480 4553)

Kati Kutzsche (0351 480 4556)



Rekrutierende klinische Studien

Onkologisches Zentrum

Tel.:

0351 – 480 3742

**(Hintergrunddienst
Hämatologie / Onkologie)**

gültig bis: 31.10.2026

Register

ALL: GMALL-Register und Biomaterialbank

Prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen und verwandter Erkrankungen in Verbindung mit einer prospektiven Biomaterialsammlung

OSHO AML-MDS - Register

Patienten > 60 Jahre mit Diagnose AML oder höher-Risiko MDS nach IPSS/IPSS-R

APL: NAPOLEON - Register

neu diagnostizierte oder rezidierte APL

OSHO Multiples Myelom - Register

Prostatakrebs: PCO - Register

Karzinome im Oro- und Hypopharynxbereich:

HPV – Register:

CUP-Syndrom, Plattenepithelkarzinome und Plattenepithelkarzinommetastase im HNO-Bereich bei nicht bekanntem Primärtumor

Studien

alle Entitäten

PROTEUS: eigene IIT

Prognostischer Einfluss des mGPS bei Erstdiagnose eines Malignoms und stationärem Aufenthalt im SKD auf das Gesamtüberleben nach 3 Jahren

DS7300-203 (Phase 1b/2)

Ifinatamab Deruxtecan (I-DXd) bei Patienten mit rezidierten oder metastasierten soliden Tumoren (IDEATE-PanTumor02)

Magenkarzinom / AEG

PREVENT – diffuser Typ Magenkrebs o. Tumoren des Übergangs zwischen Magen und Speiseröhre

HIPEC kombiniert mit FLOT-Chemotherapie im Vergleich zu alleiniger FLOT-Chemotherapie vor und nach Operation
ECOG $\leq$ 1

ZANGEA – HER2- und PD-L1-positivem metastasiertem gastroösophagealem Adenokarzinom

Kombination von Zanidatamab mit Pembrolizumab und Chemotherapie
ECOG $\leq$ 1

kolorektales Karzinom

ARMANI – RAS-mutiertes kolorektales Karzinom

Anatomische Resektion von Lebermetastasen

COMPASS – linksseitig obstruktiver

Dickdarmkrebs

Akut-Studie Vergleich zweistufige elektive Resektion vs. Notfallresektion

Kopf- und Halsbereich

BICARA (BCA101X301)

Ficerafusp Alfa (BCA101) oder Placebo in Kombination mit Pembrolizumab zur Erstlinienbehandlung von PD-L1-positivem, rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich